

Checkliste zur seuchenhygienischen Absicherung von Geflügelbetrieben

für Veterinärbehörden, betreuende Tierärzte und Geflügelhalter

auf der Grundlage der aktuellen „[Risikobewertung](#)“ zur Einschleppung sowie des Auftretens

von hochpathogenem aviären Influenzavirus in Hausgeflügelbestände in der Bundesrepublik Deutschland“ des FLI vom 14.03.2016 und der [Information des FLI](#) “Schutz vor H5N8, Anmerkungen zur Vermeidung der Verbreitung der Geflügelpest“ vom 20.11.2014

| Maßnahmen | Bedeutsam für | | | | | | Bemerkungen |
|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | Veterinärbehörden | betreuende Tierärzte | Geflügelkleinhaltungen | Kommerzielle | | | |
| | | | | Freilandhaltungen Wassergeflügel | Auslaufhaltungen Hühnervogel | Intensivhaltungen | |
| Management | | | | | | | |
| Fütterung nur in geschützten Stallbereichen, zu denen Wildvögel keinen Zugang haben | | | x | x * | x | x | * wenn mgl. |
| Fütterung nur in Unterständen in der Nähe zu Betriebsgebäuden oder dem Eingang zum Auslauf | | | | x | | | |
| Im Auslauf maximal eine halbe Tagesmenge auf einmal füttern | | | | x | | | |
| Futter- und Einstreulager effektiv vor Vogeleinflug und Verunreinigungen schützen | | | x | x | x | x | |
| Bezug von Tieren und Futter nur aus sicherer und bekannter Herkunft | | | x | x | x | x | |
| Alles-rein-alles-raus-Prinzip, sowie intensive Reinigung und Desinfektion vor Neubelegung | | | | | x | x | |
| Stall muss wildvogeldicht gestaltet sein | | | | | | x | |
| Keine futterschmutzte Silo- u. Stallumgebung | | | x | x | x | x | |
| Auslaufbereiche unattraktiv für Wildvögel gestalten (nach Möglichkeit kein Oberflächenwasser) | | | x | x | x | | |
| Kein Kontakt zu natürlichen Gewässern | | | x | x | x | | |
| Keine Verwendung von Oberflächenwasser als Tränke | | | x | x | x | | |
| Gewissenhafte und regelmäßige Kontrolle des Gesundheitszustandes der Tiere | | | x | x | x | x | |
| Tier- / Personenverkehr u. andere Vektoren | | | | | | | |
| Konsequente Anwendung und Überprüfung der Pflicht zur Aufzeichnung von Personen die gewerbsmäßig bei der Ein- u. Ausstellung von Geflügel oder bei anderen Tätigkeiten in der Geflügelwirtschaft (z.B. Schnabelkürzer) beschäftigt sind (GP-VO §§ 2) | x | x | x | x | x | x | |
| chronologische Aufzeichnungen von praktischen Tierärzten über Kontakte zu Geflügelbetrieben | x | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Unterweisung der Mitarbeiter vor Betreten der Ställe zur Seuchensituation u. –prophylaxe | | x | x | x | x | x | |
| Hygienische Reinigung der Hände vor dem Kontakt mit Tieren | x | x | x | x | x | x | |
| Anlegen betriebseigener Schutzkleidung beim Betreten von Betrieben, diese sollte nach Gebrauch im Betrieb verbleiben oder unschädlich beseitigt werden | x | x | x | x | x | x | |
| Strikter Schuhwechsel vor dem Betreten der Einzelstallungen | | | | | | x | |
| Nutzung von Desinfektionsmatten /-bädern unmittelbar vor den Stallzugängen (für Stiefel und Reifen) | | | | | | x | |
| Erfassung des Personenverkehrs zum Geflügel im Bestandsregister der Betriebe | x | x | x | x | x | x | |
| Zugangsrestriktionen: Sicherung der Bestände gegen unbefugtes Betreten | | | x | x | x | x | |
| Intensivierung der Überwachung u. Seuchenhygiene auf Geflügelausstellungen, -märkten u.ä. (Erfassen der Herkunft des Geflügels, Desinfektionsmatten) | x | x | | | | | |
| Kontrolle von Aufzeichnungen und Hygienemaßnahmen in den Betrieben | x | x | | | | | |
| Betriebseigene Arbeitsgeräte verwenden | x | x | x | x | x | x | |
| Aufzeichnungen gewerbsmäßiger Händler über Herkunft und Verbleib von gehandeltem Geflügel gem. ViehVerkV durchsetzen und überprüfen | x | x | | | | | |
| Reduzierung des Besucherverkehrs auf ein unerlässliches Mindestmaß | x | x | x | x | x | x | |
| Vermeidung des Betretens /Befahrens des Betriebsgeländes durch Zulieferer während der Produktionsphase | x | x | x | x | x | x | |
| Krankheitsüberwachung und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Meldung aller geflügelhaltenden Betriebe beim Veterinäramt überprüfen, vervollständigen und Bestandszahlen aktualisieren | x | x | x | x | x | x | |
| Erfassung von Auslauf- und Freilandhaltungen | x | x | x | x | x | x | |
| Aufzeichnung der Verluste und Leistungsdepressionen, Halter zu Verdachtsmeldungen ermuntern, unverzügliche Meldung bei Überschreiten der Grenzwerte von Verlusten in § 8 GP-VO | x | x | x | x | x | x | |
| Sofortige differentialdiagnostische Abklärung bei erhöhter Morbidität oder Mortalität in Geflügelbeständen | x | x | x | x | x | x | |
| Regelmäßige Information der Öffentlichkeit, Geflügelhalter, Geflügelverbände und Tierärzte über die aktuelle Situation durch lokale, regionale und nationale Medien wie Presse, Radio, TV, Internet z.B. www.fli.bund.de , www.verbraucherministerium.de), spezielle Medien für Zielgruppen | x | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Evtl. Hotline einrichten (national, Länder oder Kreise) | x | | | | | | |
| Informationen zur klassischen Geflügelpest bei den Geflügelhaltern verbreiten, z.B. durch Informationsblatt des FLI | x | x | | | | | |
| Wiederholte Information der Geflügelhalter zur GP-VO (evtl. Merkblatt), hier besonders Führung von Bestandsbüchern (§ 2), Aufzeichnungspflicht u. besondere Hygienemaßnahmen für Fänger (§§ 2, 8a), Meldung von Verlusten (§ 8), besondere Hygienemaßnahmen für Betriebe über 1000 Stück (§ 8b) | x | x | | | | | |
| Aufklärung von Personen, die in der deutschen Landwirtschaft tätig sind und in Länder reisen, in denen HPAI H5- oder H7-Subtypen vorkommen | x | x | | | | | |
| Konsequente Anwendung der GP-VO u. Kontrolle der Anwendung | x | x | | | | | |
| Wildvögel | | | | | | | |
| Meldung kranker oder verendeter Wildvögel an die zuständige Veterinärbehörde | x | x | x | x | x | x | |
| Festlegung von Gefährdungszonen in der Nähe von Wasservogelreservoirien und Gewässern (Ornithologen, Regionalisierung v. Dt.?) | x | | | | | | |
| Annäherung/Kontakt von Wasservögeln mit Hausgeflügel unterbinden (z.B. durch Abschreckung oder andere Maßnahmen); direkten Kontakt von Personen und Haustieren zu toten oder kranken Wildvögeln vermeiden | | | x | x | x | x | |
| Einhaltung von Hygiene- und Quarantänemaßnahmen bei Kontakt mit Wildvögeln oder mit Material, das mit diesen Vögeln in Kontakt gekommen ist | x | x | x | x | x | x | |
| Kein Kontakt von Jägern die Federwild schießen, mit Geflügel | x | x | x | x | x | x | |
| Herstellung von Kontakten zu Vogelschützern, Ornithologen u. Jägern, Zusammenarbeit besprechen | x | | | | | | |
| Seuchenhygiene | | | | | | | |
| Bestand u. Bezugsquellen von Desinfektionsmittel prüfen und evtl. Vorabsprachen tätigen | x | x | x | x | x | x | |
| Standorte von Desinfektionspunkten klären und evtl. vorbereiten | x | x | x | x | x | x | |

Abkürzungen:

GP-VO – Geflügelpestverordnung vom 23. Dezember 2005

Grundsätzliche Bemerkungen

- die Veterinärämter haben einen Überblick über die betreuenden Tierärzte der größeren Bestände und beziehen sie in ihre Arbeit mit ein
- alle Maßnahmen auf den Betrieben werden von den Veterinärämtern kontrolliert, diese arbeiten dazu mit den betreuenden Tierärzten zusammen
- betreuende Tierärzte unterstützen die Veterinärämter in allen Maßnahmen bei Betriebsbesuchen und Kontakt mit Haltern und Verbänden